

LE TRAITEMENT PAR

NAB-PACLITAXEL + GEMCITABINE

(Abraxane[®] + Gemzar[®])



INSTITUT
DE CANCÉROLOGIE
ARSÈNE BURNY

CHU
de Liège



Édito

Bonjour,

Cette brochure informative concerne le traitement par Nab-Paclitaxel et Gemcitabine que votre oncologue vous a prescrit et vous est destinée spécifiquement.

Pour tout renseignement supplémentaire concernant votre traitement, votre oncologue et votre infirmière de liaison se tiennent à votre disposition.

Vous trouverez leurs coordonnées dans votre carnet de liaison.

Le pharmacien hospitalier peut également répondre à vos questions au 04/323 33 01 ou par e-mail à l'adresse prodec.pharma@chuliege.be.

**Le Conseil de Gouvernance de
l'Institut de Cancérologie Arsène Burny**

Table des matières

1. Pourquoi m'a-t-on prescrit ce traitement?	4
2. Comment se déroule le traitement?	4
3. Quels sont les effets secondaires les plus fréquents et comment les gérer?	8
4. Quelles sont les précautions à prendre quand on suit un traitement oncologique?	16





1. Pourquoi m'a-t-on prescrit ce traitement ?

Le traitement par Nab-Paclitaxel et Gemcitabine est utilisé dans le traitement du cancer du pancréas.

2. Comment se déroule le traitement ?

Le traitement par Nab-Paclitaxel et Gemcitabine s'administre par **voie intraveineuse à l'hôpital de jour** de l'Institut de Cancérologie Arsène Burny.

Votre traitement est administré sous forme de **cycles de traitement** (également appelés « cures » de traitement) d'une durée de 28 jours. La durée totale du traitement dépend de son efficacité et de la manière dont vous le tolérez.

Cycle 1

Jour 1 : Traitement à l'hôpital
Jour 8 : Traitement à l'hôpital
Jour 15 : Traitement à l'hôpital
Jour 22 à Jour 28 : Pas de traitement oncologique (période de repos)

Cycle 2

Jour 1 : Traitement à l'hôpital
Jour 8 : Traitement à l'hôpital
Jour 15 : Traitement à l'hôpital
Jour 22 à Jour 28 : Pas de traitement oncologique (période de repos)

...






L'administration à l'hôpital de jour est réalisée 1 fois par semaine pendant 3 semaines : au 1^{er}, 8^{ème} et 15^{ème} jour du cycle (J1, J8 et J15).

Le cycle de traitement se termine avec une période de repos de 7 jours (J22 à J28). A la fin du 1^{er} cycle de traitement, un nouveau cycle de traitement démarrera.



A l'hôpital

Au 1^{er}, 8^{ème} et 15^{ème} jour du cycle (durée totale : +/- 2h) :

Produits administrés		
	Injection d'une poche de 250 ml de NaCl 0,9%	Entretien et rinçage de la voie
	Injection d'une poche de 50ml contenant une dose de méthylprednisolone	Corticoïdes (effet anti-inflammatoire)
	Injection d'une poche de 50ml contenant une dose d'alizapride	Anti-nauséux
	Injection d'une poche de 100 ml contenant une dose de nab-paclitaxel	Chimiothérapie
	Injection d'une poche de 50 ml de NaCl 0,9%	Rinçage de la voie




Injection d'une poche de 250 ml contenant une dose de gemcitabine

Chimio-
thérapie



Différentes personnes (médecins, pharmaciens, assistants pharmaceutiques, infirmiers, assistants logistiques,...) interviennent dans la mise à disposition de votre traitement. Toutes ces interventions induisent un temps d'attente avant que votre traitement ne vous soit administré mais elles sont très importantes pour votre sécurité.

3. Quels sont les effets secondaires les plus fréquents et comment les gérer ?



Réaction allergique

(difficulté à respirer, hypertension, toux, congestion nasale...)

La réaction allergique peut survenir à l'hôpital durant la perfusion ou quelques heures après celle-ci.

Il est important que vous appeliez immédiatement l'infirmière qui s'occupe de vos soins ou l'équipe médicale.



Etat grippal

(maux de tête, toux, douleurs musculaires et articulaires)

Vous pourriez ressentir un état grippal le jour du traitement.

Vous pouvez prendre du Paracétamol 1g jusqu'à 4x/jour, après avoir vérifié votre température, pour exclure la possibilité d'une infection.




Nausées, vomissement, perte d'appétit

En cas de nausées ou vomissements, vous pouvez prendre l'anti-nauséeux prescrit par votre oncologue (par exemple, Alizapride (Litican®) 50mg, 1 comprimé de 1 à 6 fois par jour). Veillez à bien respecter la quantité et la fréquence de prise recommandée par votre oncologue.

En l'absence d'amélioration dans les 48h, contactez votre infirmière de liaison ou votre oncologue durant les heures de bureau.

En cas de perte d'appétit, fractionner et enrichir vos repas peut vous aider à mieux manger.

Vous trouverez de nombreux conseils dans la brochure « **Comment gérer les nausées et les vomissements** » disponible dans votre carnet de liaison.



Diarrhée, douleurs abdominales

Si vous présentez des selles diarrhéiques, vous pouvez prendre 2 gélules de 2mg de Lopéramide (Imodium®) et ensuite 1 gélule de 2mg toutes les 4 heures ou après chaque selle molle sans dépasser 16mg/jour.

Si la diarrhée persiste plus de 24 heures malgré la prise correcte de Lopéramide, prévenez votre infirmière de liaison ou votre oncologue durant les heures de bureau ou déplacez-vous aux urgences en-dehors de ces heures.

Vous trouverez de nombreux conseils dans la brochure « **Comment gérer la diarrhée** » disponible dans votre carnet de liaison.



Engourdissement et picotements dans les mains ou les pieds/Neuropathies

Parlez-en à votre oncologue lors de la prochaine consultation.



Aphtes

Parlez-en à votre infirmière de liaison ou à votre oncologue lors de votre prochaine visite. Une bonne hygiène buccale et des bains de bouche au bicarbonate peuvent soulager ces symptômes.

Pour les bains de bouche, diluez 1 cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire dans 200ml d'eau et gargarisez de 2 à 6 fois par jour.

Vous trouverez de nombreux conseils dans la brochure « **Comment gérer l'inflammation de la muqueuse buccale** » disponible dans votre carnet de liaison.



Risque d'infection (Fièvre, frissons, toux,...)


Limitez au maximum vos contacts avec des personnes malades et avec la foule et pensez à vous laver les mains régulièrement.

Prenez votre température si vous ressentez un symptôme grippal (courbature, frissons, toux...).

En cas de fièvre **>38,3°C** ou **>38,0°C 2 fois de suite en 2 heures**, **contactez votre oncologue, votre infirmière de liaison ou votre médecin traitant** durant les heures de bureau afin d'éventuellement débiter un antibiotique.

En-dehors des heures de bureau, si vous ne vous sentez vraiment pas bien, présentez-vous au service des urgences.





Saignements (y compris hématomes spontanés, petits points mauves sur la peau, selles noires)

Contactez rapidement votre infirmière de liaison ou votre oncologue durant les heures de bureau ou le service des urgences en-dehors de ces heures.



Problèmes de peau (sécheresse ou éruptions cutanées)

Pour éviter la déshydratation de votre peau, vous pouvez prendre des douches tièdes et courtes, utiliser un savon doux et hydratant sans parfum ainsi que des crèmes épaisses sans alcool.

Évitez les expositions au soleil et utilisez une protection solaire avec un indice 50+ en cas d'exposition.

Si vous avez des démangeaisons, parlez-en à votre infirmière de liaison ou à votre oncologue lors de la prochaine visite. De la cétirizine (Zyrtec® ou un générique), 10mg 1 comprimé 1x/jour pourra vous être prescrite. La Cétirizine peut provoquer de la somnolence. Prenez donc ce médicament de préférence le soir et soyez prudent en cas de conduite automobile ou d'utilisation de machines.



Gonflement du visage et des membres (œdèmes)

Évitez de porter des vêtements serrants (élastiques, ceintures, ...) et instaurez une alimentation à faible teneur en sel.

En cas de gonflement des jambes, essayez de vous reposer en surélevant vos pieds et en portant des bas de contention.


Si le gonflement ne disparaît pas rapidement ou si vous constatez une prise de poids rapide et inattendue, contactez votre médecin traitant, votre oncologue ou votre infirmière de liaison dès que possible.



Fatigue

Il n'existe pas de médicament qui vous empêchera d'être fatigué. Restez actif sur le plan physique tout en vous accordant des périodes de repos.


Vous trouverez de nombreux conseils dans la brochure « **Comment gérer la fatigue** » disponible dans votre carnet de liaison.



Perte des cheveux

Vous pouvez rencontrer une esthéticienne sociale qui vous donnera des conseils à ce sujet (utiliser un shampooing doux, couper vos cheveux courts, éviter les colorations, les brushings, les sèche-cheveux et les lisseurs). Vous pouvez également vous procurer une perruque pour laquelle la mutuelle intervient.

Soyez rassuré(e), les cheveux repoussent 1 mois après l'arrêt du traitement.



Fragilité des ongles

Cet effet se développe généralement après 4 à 8 cycles de traitement.

Pour prévenir cet effet, coupez vos ongles de manière optimale, utilisez des chaussures adaptées, limitez les traumatismes tels que les manucures et appliquez un vernis durcisseur.

En cas de cassures avec suintement, vous pouvez réaliser des bains d'eau tiède avec de l'Isobétadine.

Soyez rassuré(e), les ongles redeviendront normaux quelques jours après l'arrêt du traitement.

IMPORTANT

La liste d'effets secondaires n'est pas exhaustive. En cas d'apparition d'un **effet secondaire « urgent »** (douleur à la poitrine, difficultés à respirer,...) **présentez-vous directement aux urgences.**

Votre **médecin traitant** peut également vous guider dans la gestion des effets secondaires liés à votre traitement.

Les effets secondaires varient fortement d'un patient à un autre. Ne vous laissez donc pas influencer par l'expérience d'autres personnes.


L'intensité des effets secondaires n'est pas liée à l'efficacité du traitement. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'effets secondaires que votre traitement est plus efficace et, inversement, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'effets secondaires que votre traitement n'est pas efficace. Certains effets secondaires peuvent également être liés à la maladie elle-même et pas nécessairement au traitement.

Prenez les médicaments prescrits par votre oncologue contre les effets secondaires en **respectant strictement les doses prescrites.**

L'équipe médicale se tient à votre disposition en cas de besoin et des fiches informatives avec des **conseils diététiques et d'hygiène de vie** pour vous aider à gérer ces effets secondaires sont disponibles dans le carnet de liaison ou auprès de l'équipe médicale.



4. Quelles sont les précautions à prendre quand on suit un traitement oncologique ?




Le traitement par Nab-Paclitaxel et Gemcitabine peut interagir avec d'autres médicaments ou produits. Cela peut entraîner une modification de l'efficacité et/ou de la tolérance du traitement par Nab-Paclitaxel et Gemcitabine ou des autres

produits.


Il vous est dès lors demandé de :

- Communiquer la liste complète de vos médicaments à votre oncologue et de ne pas débuter de nouveaux traitements/produits sans avis médical (médicaments sur prescription ou non, y compris les sprays, les crèmes, les compléments alimentaires et les préparations à base de plantes).
- Informer tous les professionnels de la santé que vous rencontrerez que vous recevez un traitement par Nab-Paclitaxel et Gemcitabine.



Le traitement fragilise votre peau et le soleil risque de provoquer des taches de dépigmentation.

Il est dès lors recommandé de porter un chapeau et d'appliquer un écran total en cas de promenade au soleil.



Il n'y a pas vraiment d'évidences pour des restrictions alimentaires strictes mais afin de limiter le risque de développer une infection,

il est recommandé d'éviter certains aliments:

- Les poissons crus
- Les coquillages (ex : moules, huîtres, coquilles St-Jacques)
- La viande crue (filet américain ou viandes saignantes)

Les scampis et les charcuteries sont autorisés.


Le traitement que vous recevez est éliminé de manière naturelle, comme tout autre médicament que vous pourriez prendre. Il est éliminé durant le traitement et jusqu'à 7 jours après la prise.

Il est donc recommandé de :



- Vous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, notamment après chaque passage aux toilettes ;

- De tirer la chasse 2x après avoir fermé le couvercle.



Que vous soyez une femme ou un homme, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, il est important que vous utilisiez un moyen de **contraception efficace** (préservatifs en plus d'une autre méthode) pendant toute la durée du traitement **et pendant une période allant jusqu'à 3 mois après**. En effet, le traitement pourrait être nocif pour votre enfant à naître.

Si malgré toutes les précautions vous (ou votre partenaire) tombez enceinte durant l'utilisation de ce médicament, avertissez immédiatement votre oncologue.



Si vous êtes jeune maman et que vous allaitez, il est important d'interrompre cet allaitement pour la sécurité de votre nourrisson.



Cette fiche n'est pas exhaustive.

Pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, vous pouvez vous référer à la notice du médicament disponible sur le site web suivant :

<https://www.cbip.be>



Institut de Cancérologie Arsène Burny – CHU de Liège

Editeur responsable : CHU de Liège
Avenue de l'Hôpital, 1 - 4000 Liège
Mai 2025