

Précautions


- Il est préférable **d'éviter de consommer de l'alcool** durant le traitement.
- Prévenez tout professionnel de la santé (médecin, pharmacien, etc.) de la prise d'Epclusa®.
- L'Epclusa® peut augmenter ou diminuer l'effet d'autres médicaments. Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet de l'Epclusa®.
Ne prenez jamais un nouveau médicament, un complément alimentaire, un produit à base de plantes, avec ou sans ordonnance, **sans en parler préalablement à votre médecin ou à votre pharmacien.**
- En cas de **grossesse**, de **désir de grossesse** ou d'**allaitement**, demandez conseil à votre médecin.

?

Si vous avez d'autres questions concernant votre traitement, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien

Retrouvez cette fiche en ligne :


www.chuliege.be/pharmacie-info-medicaments



Département de Pharmacie hospitalière
Éditeur responsable :
CHU de Liège – avenue de l'Hôpital 1 – B-4000 Liège
Avril 2025

CHU
de Liège

EPCLUSA® (Sofosbuvir + Velpatasvir)



Nom/prénom :

Médecin ayant initié le traitement (cachet) :

Date de début :

Durée/date de fin :

L'Epclusa® est utilisé dans le traitement du virus de l'hépatite C chez l'adulte.

Pharmacie hospitalière

Mécanisme d'action du médicament

Le médicament est composé de deux substances actives : le sofosbuvir et le velpatasvir. Ces deux molécules agissent ensemble en bloquant deux protéines différentes essentielles à la reproduction du virus.

Mode d'emploi

- Les comprimés d'Epclusa® s'administrent par **voie orale**.
- Prenez l'Epclusa® **tous les jours à la même heure**. Choisissez le moment de la journée le plus adéquat afin de ne pas oublier de prendre ce traitement.
- L'Epclusa® peut être pris avec ou sans nourriture.
- Les comprimés d'Epclusa® doivent être avalés en entier. Ils ne peuvent **pas être croqués, mâchés, ni écrasés**.
- Si vous prenez un antiacide (Maalox® Gaviscon®, etc.), prenez-le au moins **4h avant ou 4h après** l'Epclusa®.
- Si vous prenez un inhibiteur de la pompe à protons (Losec®, Pantomed®, Nexiam®, etc.), prenez-le au **moins 4h après** l'Epclusa®.
- Conservez les comprimés à **température ambiante** et à **l'abri de l'humidité**.

En cas d'oubli

- Si **moins de 18h** se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise :
 - **Prenez immédiatement la dose oubliée ;**
 - Poursuivez le schéma de prise habituelle dès le lendemain.
- Si **plus de 18h** se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise :
 - **Ne prenez pas la dose oubliée ;**
 - Poursuivez le schéma de prise habituelle dès le lendemain.
- **Ne prenez jamais deux doses en même temps pour compenser la dose oubliée.**
- **En cas d'oubli de plus d'une dose, prévenez votre médecin traitant.**

En cas de vomissements

- Si **moins de 3h** se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise :
 - **Reprenez une nouvelle dose ;**
 - Poursuivez le schéma de prise habituelle dès le lendemain.
- Si **plus de 3h** se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise :
 - **Ne reprenez pas de nouvelle dose ;**
 - Poursuivez le schéma de prise habituelle dès le lendemain.

Effets secondaires

A côté de ses effets bénéfiques, l'Epclusa® peut présenter des effets secondaires.

Ceux-ci n'apparaissent pas systématiquement.

Voici les effets secondaires principaux :

- Fatigue
- Nausées
- Maux de tête

En cas d'effets secondaires significatifs ou d'intolérances, veuillez contacter votre médecin prescripteur.

