

Précautions


- Prévenez tout professionnel de la santé (médecin, pharmacien, etc.) de la prise de Raxone®.
- Le Raxone® peut augmenter l'effet d'autres médicaments.
Ne prenez jamais un nouveau médicament, un complément alimentaire, un produit à base de plantes, avec ou sans ordonnance, **sans en parler préalablement à votre médecin ou à votre pharmacien.**
- **Si vous souffrez d'insuffisance rénale ou hépatique**, veuillez en avertir votre médecin.
- Le Raxone® est déconseillé en cas de **grossesse**. En cas de grossesse ou de désir de grossesse, veuillez contacter votre médecin.

?

Si vous avez d'autres questions concernant votre traitement, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien

Retrouvez cette fiche en ligne :


www.chuliege.be/pharmacie-info-medicaments



Département de Pharmacie hospitalière
Éditeur responsable :
CHU de Liège – avenue de l'Hôpital 1 – B-4000 Liège
Avril 2025

CHU
de Liège

RAXONE®
(Idébénone)



Nom/prénom :

Médecin ayant initié le traitement (cachet) :

Date de début :

Durée/date de fin :

Le **Raxone®** est utilisé dans le traitement des troubles de la vision appelés neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL).

Pharmacie hospitalière

Mécanisme d'action du médicament

Le médicament est composé d'une substance active : l'idébénone. Il s'agit d'un antioxydant. Celui-ci va rétablir la production d'énergie produite par les cellules de l'œil. Cela permet de réactiver des cellules oculaires inactives chez les patients atteints de neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL).

Mode d'emploi

- Les comprimés de Raxone® s'administrent par **voie orale**.
- Prenez les comprimés de Raxone® **tous les jours à la même heure** (petit-déjeuner, dîner et souper).
- **Le Raxone® doit être pris en mangeant.**
- Les comprimés de Raxone® doivent être avalés en entier avec de l'eau. Ils ne peuvent **pas être croqués, mâchés, ni écrasés.**
- Conservez les comprimés à **température ambiante** et à **l'abri de l'humidité.**

En cas d'oubli

- Si vous avez oublié une dose :
 - **Ne prenez pas la dose oubliée ;**
 - Poursuivez le schéma de prise habituelle dès le lendemain.
- **Ne prenez jamais deux doses en même temps pour compenser la dose oubliée.**

En cas de vomissements

- Si vous avez vomi :
 - **Ne reprenez pas de dose ;**
 - Poursuivez le schéma de prise habituelle pour les doses suivantes.

Effets secondaires

A côté de ses effets bénéfiques, le Raxone® peut présenter des effets secondaires.

Ceux-ci n'apparaissent pas systématiquement.

Voici les effets secondaires principaux :

- Rhinopharyngite, rhume
- Toux
- Diarrhée
- Maux de dos

En cas d'effets secondaires significatifs ou d'intolérances, veuillez contacter votre médecin prescripteur.

