

## Précautions


- Il est préférable **d'éviter de consommer de l'alcool** durant le traitement (principalement au début du traitement et lors d'un changement de dose) car le risque de chutes et d'accidents peut être augmenté.
- Prévenez tout professionnel de la santé (médecin, pharmacien, etc.) de la prise de Sativex®.
- Le Sativex® peut augmenter ou diminuer l'effet d'autres médicaments. Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet de Sativex®.  
**Ne prenez jamais un nouveau médicament**, un complément alimentaire, un produit à base de plantes, avec ou sans ordonnance, **sans en parler préalablement à votre médecin ou à votre pharmacien.**
- Informez-vous auprès de votre médecin neurologue sur votre **aptitude à la conduite** de véhicule et l'utilisation des machines dangereuses.
- Le Sativex® est contre-indiqué durant la **grossesse**. En cas de grossesse ou de désir de grossesse, demandez conseil à votre médecin.
- Si vous désirez partir à l'étranger, assurez-vous que vous pouvez légalement emporter votre médicament.



Si vous avez d'autres questions concernant votre traitement, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien

Retrouvez cette fiche en ligne :

[www.chuliege.be/pharmacie-info-medicaments](http://www.chuliege.be/pharmacie-info-medicaments)



Département de Pharmacie hospitalière  
Éditeur responsable :  
CHU de Liège – avenue de l'Hôpital 1 – B-4000 Liège  
Avril 2025



## SATIVEX® (Delta-9-tétrahydrocannabinol + Cannabidiol)



Nom/prénom : .....

Médecin ayant initié le traitement (cachet) :

Date de début : .....

Durée/date de fin : .....

Le **Sativex®** est utilisé dans le traitement des symptômes de la sclérose en plaque. Il diminue les sensations de raideur et de rigidité musculaire appelées spasticité.

Pharmacie hospitalière

## Mécanisme d'action du médicament

Le médicament est composé de deux substances actives : le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) et le cannabidiol (CBD). Ces deux molécules agissent sur les récepteurs CB1 et CB2 des terminaisons nerveuses au niveau du cerveau. Ces récepteurs sont responsables de la relaxation musculaire.

## Mode d'emploi

- Le spray de Sativex® est administré par **pulvérisation buccale**.
- Le Sativex® peut être pris avec ou sans nourriture. Dans la mesure du possible, veuillez le prendre à chaque fois de la même manière.
- Pulvérisez le Sativex® dans la bouche, à l'intérieur de la joue ou sous la langue en **changeant**, à chaque pulvérisation, **de site d'administration**.
- Assurez-vous de n'effectuer **qu'une seule pulvérisation à la fois** et **espacez chaque pulvérisation d'au moins 15 minutes**.
- Assurez-vous de suivre le calendrier de pulvérisation fourni par votre médecin.
- Conservez le Sativex® non ouvert en position verticale au réfrigérateur (2°C à 8°C).
- Conservez le spray de Sativex® ouvert pendant **maximum 42 jours** à température ambiante (maximum 25°C).

## En cas d'oubli

- Si **vous avez de oublié de prendre une dose** : **prenez immédiatement la pulvérisation oubliée** au moment où vous vous en apercevez ou si vous en ressentez le besoin.
- **Ne prenez jamais deux doses en même temps pour compenser la dose oubliée.**

## Effets secondaires

A côté de ses effets bénéfiques, le Sativex® peut présenter des effets secondaires. Ceux-ci n'apparaissent pas systématiquement.

**Voici les effets secondaires principaux :**

- Étourdissements
- Somnolence et fatigue
- Sensation d'ivresse
- Perte d'équilibre ou chute
- Maux de tête
- Nausées
- Goût désagréable et sécheresse de la bouche

Pour éviter le goût désagréable en bouche lors de la pulvérisation, vous pouvez prendre une pastille à sucer (menthe ou cerise) avant d'utiliser le Sativex®.

Lorsque vous ressentez des effets secondaires (étourdissements), veuillez réduire le nombre de pulvérisations de une chaque jour jusqu'à ce que vos symptômes soient soulagés avec le moins d'effets secondaires possibles. Voici les effets secondaires principaux :

**Si vous ressentez les effets secondaires suivants, veuillez arrêter votre traitement et consulter votre médecin :**

- Sensation anormale
- Hallucinations
- Symptômes de dépression ou de confusion
- Sensation de surexcitation ou de perte de contact avec la réalité

Cela ne signifie pas toujours que le médicament ne vous convient pas. Après consultation, le médecin peut vous conseiller de diminuer le nombre de pulvérisations.

En cas d'effets secondaires significatifs ou d'intolérances, veuillez contacter votre médecin prescripteur.

