

Précautions


- Prévenez tout professionnel de la santé (médecin, pharmacien, etc.) de la prise de Wakix®.
- Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet du Wakix®. Le Wakix® peut augmenter l'effet d'autres médicaments.
Ne prenez jamais un nouveau médicament, un complément alimentaire, un produit à base de plantes, avec ou sans ordonnance, **sans en parler préalablement à votre médecin ou à votre pharmacien.**
- Informez-vous auprès de votre médecin neurologue sur votre **aptitude à la conduite** de véhicule et l'utilisation des machines dangereuses.
- Si vous souffrez **d'insuffisance rénale**, prévenez votre médecin prescripteur. La posologie doit être adaptée en conséquence.
- Le Wakix® ne peut **pas être pris durant la grossesse**. Il est recommandé d'utiliser une méthode contraceptive efficace pendant le traitement par Wakix® et ce jusqu'à 21 jours après l'arrêt du traitement.

?

Si vous avez d'autres questions concernant votre traitement, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien

Retrouvez cette fiche en ligne :

www.chuliege.be/pharmacie-info-medicaments



Département de Pharmacie hospitalière
Éditeur responsable :
CHU de Liège – avenue de l'Hôpital 1 – B-4000 Liège
Avril 2025

CHU
de Liège

WAKIX®
(Pitolisant)



Nom/prénom :

Médecin ayant initié le traitement (cachet) :

Date de début :

Durée/date de fin :

Le **Wakix®** est utilisé dans le traitement de la narcolepsie.

Pharmacie hospitalière

Mécanisme d'action du médicament

Le médicament est composé d'une substance active : le pitolisant. Cette substance active va augmenter l'activité des cellules histaminergiques du cerveau impliquées dans la vigilance.

Cela contribue à :

- Diminuer la somnolence et augmenter l'éveil et la vigilance pendant la journée.
- Diminuer la cataplexie

Mode d'emploi

- Les comprimés de Wakix® s'administrent par **voie orale**.
- Prenez le Wakix® **tous les jours à la même heure** (le matin au petit déjeuner). Si vous prenez votre traitement l'après-midi, vous risquez de ne pas savoir vous endormir le soir.
- Conservez les comprimés à **température ambiante** et à **l'abri de l'humidité**.

En cas d'oubli

- Si vous avez oublié une dose :
 - **Ne prenez pas la dose oubliée ;**
 - Poursuivez le schéma de prise habituelle dès le lendemain.
- **Ne prenez jamais deux doses en même temps pour compenser la dose oubliée.**

En cas de vomissements

- Si vous avez vomi :
 - **Ne reprenez pas de dose ;**
 - Poursuivez le schéma de prise habituelle pour les doses suivantes.

Effets secondaires

A côté de ses effets bénéfiques, le Wakix® peut présenter des effets secondaires.

Ceux-ci n'apparaissent pas systématiquement.

Voici les effets secondaires principaux :

- Difficultés à dormir, anxiété, irritabilité, symptômes de dépression, troubles du sommeil
- Maux de tête, vertiges, pertes d'équilibre, tremblements
- Nausées, vomissements, indigestions
- Fatigue

En cas d'effets secondaires significatifs ou d'intolérances, veuillez contacter votre médecin prescripteur.

